

CURS MONITORATGE DE TRANSPORT ESCOLAR



Núria Buira Clua


Pedagoga, especialitzada en desenvolupament infantil

Sara Llutart Peri

Fisioterapeuta, especialitzada en pediatria

PARÀLISI CEREBRAL INFANTIL

PARLEM DEL TRASTORN PERMANENT DEL MOVIMENT I LA POSTURAL (PARÀLISI) QUE APAREIX A LA INFÀNCIA.



Hemiplegia – Diplegia – Tetraplegia – Monoplegia – Paraplegia

TRASTORNS DE MOBILITAT

- HIPOTONIA
- HIPERTONIA
- ESPASTICITAT
- MOVIMENT REFLEX

TRASTORNOS DE LA SENSIBILITAT

Problemes per processar informació que rebem



Disfunció de la Integració Sensorial

OÏDA, VISTA, GUST, OLFACTE, I TACTE

VESTIBULAR

PROPIOCEPCIÓ

(CONSCIÈNCIA DE LA POSICIÓ DEL COS)

(EQUILIBRI, COORDINACIÓ, I SENSACIÓ DE MOVIMENT)

HIPERSENSIBILITAT

- ALGUNES CARACTERÍSTIQUES
 - molt inquiets, molt sensibles a l'entorn
 - No suporten escoltar un soroll excessiu
 - s'espanten fàcilment
 - tenen un olfacte molt desenvolupat
 - els molesta la fricció dels mitjons si no estan ben posats, una arruga al pantaló o el jersei els pot molestar molt si no poden canviar la posició al seure per si mateixos...
 - Reaccionen de manera exagerada davant dels estímuls i qualsevol canvi en la seva rutina quotidiana els produeix un gran neguit.

HIPOSENSIBILITAT

- ALGUNES CARACTERÍSTIQUES
 - poden ser molt bellugadissos, necessiten moure's contínuament
 - cal sentir molt fort qualsevol estímulo, per notar-lo
 - Poden no ser conscients de la força que fan a l'agafar una cosa, o algú, perquè no perceben la pressió que fan sobre aquell cos.
 - Poden patir lesions a la pell perquè no noten si l'aigua està molt calenta...
 - O senzillament, pot ser un problema afegit a la PCI, i poden tenir la mà ajupida a la seva cadira i no notar-ho...


QUÈ ÉS EL CONTROL POSTURAL?

És la capacitat per controlar la nostra posició del cos; és necessari perquè puguem realitzar les activitats de la vida diària.

La falta de control postural



adoptar diferents posicions incorrectes i incòmodes



perill de produir-se danys



inseguretats i de por

QUÈ ÉS EL CONTROL POSTURAL?

- quan no es pot controlar la postura cal fer servir ajudes tècniques
- les cadires seran la base per poder desplaçar-se
- podem afegir més ajudes tècniques (seients adaptats, cinturons, tirants, reposacaps...) per ajudar a controlar el seu cos i evitar inclinacions que poden suposar un perill
- és important respectar la posició reclinada del seient; si és la posició habitual del nen/a noi/a ens indica que no és capaç de mantenir el seu cos o el seu cap de manera voluntària.

SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



SEGURETAT: CADIRES I SUBJECCIONS



QUÈ ÉS UNA CONVULSIÓ

**MOVIMENT INCONTROLABLE
DELS MÚSCULS, QUE PASSA
QUAN LES CÈL·LULES NERVIOSES
DEL CERVELL SE SOBREEXCITEN I
NO FUNCIONEN
ADEQUADAMENT.**

I COM IDENTIFICAR-LA

- Sensació d'estar molt espantats sense raó aparent.
- Mirada fixa o confusió inusual.
- Rigidesa del cos.
- Tremolor generalitzat.
- Sacsejades de tot el cos o només d'una zona concreta.
- Baveig excessiu o escuma a la boca.
- Pèrdua de control d'esfínters.
- Caiguda sobtada.
- Petar de dents, moviments de llavis o masticació involuntària.

EN CAS D'EPILEPSIA



PROTOCOL EPILEPSIA

Associació sense ànim de lucre per visibilitzar i naturalitzar l'epilèpsia.

IDENTIFICA ALGÚ AMB UNA CRISI FOCAL AMB O SENSE CONSCIÈNCIA ALTERADA

Mirada perduda



Mastegant



Moviments estranys



Deambulant



Tremolant



Llenguatge confús





S'HA DE FER:



CONSERVA LA CALMA



**TREU ELS OBJECTES
PROPER PER A QUE NO
ES LESIONI**



**DEIXA QUE ES MOGUI
O TREMOLI**



**POSA-LI ALGUNA
COSA TOVA SOTA EL
CAP**



NO S'HA DE FER:

**NO LI OBRIS LA BOCA
NI LI POSIS RES DINS**



NO EL MOGUIS



NO L' IMMOBILITZIS



**NO LI FACIS EL BOCA
A BOCA**





S'HA DE FER:



**AFLUIXA-LI LA ROBA
I/O TREU-LI ELS
COMPLEMENTS**



**POSA'L EN
POSICIÓ DE
SEGURETAT (DE
COSTAT)**



**SI DURA MÉS DE 2-3
MINUTS TRUCA A
EMERGÈNCIES**




NO S'HA DE FER:

NO LI CRIDIS



**NO LI DONIS NI
ALIMENTS NI AIGUA**



DIBUIXANT: IVÁN MARGO



sijopuctutambeepilep.org



[sijopuctutambe.epilep](https://www.instagram.com/sijopuctutambe.epilep)



sijopuctutambe.epilep@gmail.com

ACTUACIONS DAVANT ENNUEGAMENT

PER MUCOSITAT O VÒMIT

És freqüent que els nens amb paràlisi cerebral pateixin trastorns respiratoris, degut a la falta de mobilitat, i la dificultat per expulsar el moc.

Després d'un "atac" de tos es possible que quedin mocs a la boca, i per ajudar als nens i nenes amb dificultats per expulsar-los caldrà que els ajudem a mantenir el cap inclinat cap endavant.



Perill important d'asfixia.